

سطوح اولویت اعزام	
قرمز	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ افت هوشیاری / عدم پاسخ</li> <li>✓ شواهد تنفس ناکافی یا غیر موثر مانند سیانوز</li> </ul>
نارنجی	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ هوشیاری ناکامل یا بی قراری شدید</li> <li>✓ نشانه های دیسترس حاد تنفسی شامل: صدادر شدن تنفس، تقلای تنفسی، بی قراری شدید، ناتوانی در تکلم، ناتوانی در بلع بزاق یا ... همراه با تنگی نفس</li> <li>✓ غش، سیاهی رفتن چشم ها یا احساس سبکی سر و یا تعریق شدید همراه با تهوع/ استفراغ</li> <li>✓ آنژین ناپایدار شامل: شروع درد در دو ماهه اخیر، درد در حالت استراحت، تغییر الگوی درد (افزایش مدت شدت درد، شروع درد با فعالیت کمتر نسبت به روزهای گذشته)</li> </ul>
زرد	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ سابقه قلبی</li> <li>✓ مصرف داروها یا مواد محرک مانند اکستازی، شیشه و ...</li> <li>✓ سن بالای ۳۵ سال</li> <li>✓ آنژین پایدار: درد تیبیک قلبی در مورد شناخته شده بیماری کرونر که هیچ کدام از معیارهای آنژین ناپایدار را ندارد و در حال حاضر فاقد علامت است.</li> </ul>
سبز	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ درد غیر تیبیک قلبی در بیمار زیر ۳۵ سال که در حال حاضر کاملاً رفع شده و هیچ یک از شواهد آنژین ناپایدار را ندارد و بیمار ریسک فاکتورهای دیابت، سابقه خانوادگی مثبت و بیماری قلبی را ندارد.</li> </ul>
<p>***در صورت در اختیار داشتن موتور آمبولانس:</p> <p>موارد قرمز: به صورت پیشرو</p> <p>موارد نارنجی: در صورت ترافیک به عنوان پیشرو</p> <p>موارد زرد و سبز به تنهایی جهت بررسی وضعیت بیمار اعزام می گردد.</p>	

توصیه های قبل از رسیدن EMS
بیمار را در هر وضعیتی که راحت تر است قرار دهید.
کلیه لباسهای تنگ سر و گردن بیمار را آزاد کنید
اجازه هیچگونه فعالیت اضافه ای را به بیمار ندهید و محیط را برای او آرام کنید.
اجازه خوردن و آشامیدن را به بیمار ندهید.
در صورت امکان داروهای مصرفی بیمار را در کنار وی قرار دهید.
در صورتیکه بیمار مصرف کننده آسپیرین می باشد:
در صورتیکه خونریزی فعال ندارد، بخصوص خونریزی گوارشی؛ در صورتیکه آسم آسپیرین ندارد؛
صورتیکه در دو هفته گذشته جراحی بزرگ ندارد؛
در صورت بروز مشکل جدید با من تماس بگیرید.